

Medicamentos ototóxicos

Son aquellos medicamentos que tienen en su composición agentes perjudiciales para el oído y que, por tanto, pueden empeorar la audición.

Como con cualquier medicación, consulte siempre a su médico.

A continuación, puede observar una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración (2008):

Familia

Fármaco

Afección sobre

Antibióticos aminoglucósidos

Estreptomicina
Dihidroestreptomicina
Capreomicina
Framicetina
Neomicina

Gentamicina
Tobramicina
Amikacina
Netilmicina
Espectinomycin
Kanamicina
Paromomicina

Cóclea y vestíbulo

En algunos casos, nervio auditivo

Antibióticos macrólidos y afines

Eritromicina
Azitromicina
Claritromicina
Clindamicina
Lincomicina

Cóclea

Antibióticos glucopeptídicos

Vancomicina
Teicoplanina

Nervio auditivo y vestíbulo

Otros antibióticos

Minociclina
Clorafenicol
Cefalexina
Teicoplanina

Coclear y/o vestibular

Diuréticos

Furosemida
Bumetanida
Piretanida
Torasemida

Cóclea

Salicilatos

Ácido acetil salicílico
Otros salicilatos

Cóclea

Antimaláricos

Quinina
Cloroquina
Hidroxicloroquina y Primaquina
Primetamina

Coclear y/o vestibular

Citostáticos

Bleomicina
Cisplastino
Vincristina
Misonidazol
Carboplatino
Ciclofosfamida
Ifosfamida
Metotrexato
Dactinomicina
Droloxifeno

Coclear y/o vestibular

Bloqueadores Beta

Propanol
Practolol

Coclear

Otros

Desferroxiamina
Dextropropoxifeno
Nortriptilina
Imipramina
Quinidina

Coclear y/o vestibular

